

فیلین پنتوکسی - PENTOXIFYLLINE

نام لاتین: pentoxifylline

نام فارسی: پنتوکسی فیلین

مصرف در حاملگی: C

گروه درمانی - دارویی: مشتق گزانتین - وازودیلاتور - آنتی پلاکت

اشکال دارویی:

E.C Tab: 400mg

فارماکوکینتیک - دینامیک ، مکانسیم اثر:

جذب خوب گوارشی، متابولیسم عبور اولیه کبدی، نیمه عمر پلاسمایی ۰.۸-۰.۴ ساعت، دفع کلیوی و 4% مدفوعی، کاهش دفع در کهنسالان و بیماران کبدی، توزیع در شیر مادر.

مصرف برحسب اندیکاسیون:

• - درمان علامتی بیماری عروق محیطی (لنگش متناوب)

مصارف جانبی:

- - درمان سایکوپاتولوژیک در نارسایی عروق مغزی؛ -
- - آنژیوپاتی و نوروپاتی دیابتیک؛
- - حملات ایسکمیک گذرای مغزی
- - سکته مغزی؛
- - زخم پا؛
- - تالاسمی سیکل سل؛
- - بیماری حاد ارتفاع زیاد؛
- - اختلالات حاد و مزمن شنوایی؛
- - استوماتیت ایدیوپاتیک شدید راجعه
- - اختلالات عروق چشمی؛
- - پدیده رینود

تداخلات مهم:

دارویی:

- افزایش تاثیر ضدانعقادی داروهای آنتی کواگولانت و داروهای ضد فشارخون،
- تشدید تاثیر عوارض تئوفیلین

آزمایشگاهی: موردی گزارش نشده

موارد منع مصرف و احتیاط:

منع مصرف: حساسیت به متیل گزانتینها، خونریزی مغزی یا شبکه ای اخیر، دوران شیردهی
احتیاط: انسداد عروق محیطی، مصرف وارفارین، کودکان، سالمندان

عوارض جانبی:

شایع ترین: سوءهاضمه
 مهم ترین: موردی گزارش نشده
 سایر عوارض: سردرد، سرگیجه، تهوع، استفراغ، درد شبه آنژینی، لرزش، نفخ، درد قفسه سینه.

مصرف در بارداری و شیردهی:

تجویز با احتیاط در دوره بارداری، تجویز بسیار با احتیاط در دوره شیردهی

مسمومیت و درمان:

علائم: گرگرفتگی، هیپوتانسیون، تشنج، خواب آلودگی، از دست دادن هوشیاری، تب، آژیتاسیون
 درمان: شستشوی معده، کنترل فشارخون و تشنج، تجویز ذغال فعال.

توجهات پزشکی - پرستاری ، آموزش بیمار - خانواده:

- ایجاد دهیدراتاسیون در صورت بروز عوارض گوارشی؛
- درمان مناسب برای بیمارانی که نمی توانند جراحی شوند.
- پرهیز از خرد کردن یا جویدن دارو؛
- انقباض عروق و تشدید بیماری در صورت مصرف نیکوتین (سیگار)

نام تجاری:

trental , pentomer , vasonit , elorgan , pentoxi tarental, apo-Pentoxifylline

پنتوکسی فیلین

دکتر رهام صادقی - اطلاعات داروها