

سیپروهپتادین - CYPROHEPTADINE

نام لاتین: cyproheptadine

نام فارسی: سیپروهپتادین

مصرف در حاملگی: B

گروه درمانی - دارویی: مشتق پی پریدین - ضد حساسیت - آرام بخش - آنتی موسکارینیک - محرک اشتها

اشکال دارویی:

قرص 4mg Tab Scored

فارماکوکینتیک - دینامیک ، مکانسیم اثر:

این دارو آنتاگونیست گیرنده H1 ، آنتاگونیست سروتونین و بلاک کننده گیرنده کلسیم است. دفع از طریق ادرار و مدفوع

مصرف برحسب اندیکاسیون:

- درمان علامتی وضعیت‌های آلرژیک شامل کهیر، آنژیوادم، رینیت ، کنژنکتیویت و بیماری‌های پوستی خارش‌دار
- پیشگیری و درمان سردردهای عروقی (شامل میگرن)
- اختلالات اشتها
- درمان علامتی سندرم کارسینوئید
- درمان آنژین پریزمتال مقاوم به درمان .
- درمان بعضی از اختلالات اندوکرینی نظیر بیماری کوشینگ، هیپرپلازی مادرزادی آدرنال، سندرم آمنوره گالاکتوره
- درمان اختلالات جنسی ناشی از داروهای SSRI

تداخلات مهم:

آزمایشگاهی:

- ۴ ساعت قبل از انجام آزمون‌های حساسیتی قطع شود.

- این دارو می‌تواند جواب ترشح هورمون رشد به هیپوگلیسمی ایجاد شده توسط انسولین را کم نشان دهد.

موارد منع مصرف و احتیاط:

در کودکان زیر ۲ سال، نوزادان ترم یا نارس، سابقه واکنش حساسیت بیش از حد نباید مصرف شود.

مصرف در بارداری و شیردهی:

از نظر مصرف در بارداری در گروه B است. مصرف در شیردهی توصیه نمی‌شود.

توجهات پزشکی - پرستاری ، آموزش بیمار - خانواده:

- عوارض گوارشی را می‌توان با مصرف دارو با غذا یا شیر کاهش داد.
- تا مشخص نشدن عوارض نهایی دارو از بیمار بخواهید از انجام اموری که نیازمند دقت است (رانندگی) خودداری کند
- این دارو می‌تواند عوارض داروهایی چون الکل، باریتورات‌ها، مخدرها، ضد اضطرابها و سایر سرکوبگرهای CNS را تشدید کند.

نام تجاری:

cypractin , periaction

سیپروهیتادین

1390 ، خرداد 3 ، شنبه سه | drugsinfo